



นายแพทย์นที รักษาदारวรรณ แพทย์ศูนย์ส่องและระบบประสาทได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ยารักษาปวดศีรษะขณะตั้งครรภ์ (จากคอลัมน์ Brain Brain Brain) เพื่อให้คุณแม่ทราบและระวังในการใช้ยา ดังนี้. พ.นที รักษาदारวรรณ

นายแพทย์นที รักษาदारวรรณ แพทย์ศูนย์ส่องและระบบประสาทได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ยารักษาปวดศีรษะขณะตั้งครรภ์ (จากคอลัมน์ Brain Brain Brain) เพื่อให้คุณแม่ทราบและระวังในการใช้ยา ดังนี้

ยาในกลุ่ม B ใช้ได้ในระยะ 3 เดือนแรก:

- ยาแก้ปวดง่าย ๆ : Acetaminophen, Caffeine
- ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs : Ibuprofen, Naproxen
- ยาระงับอาการซึมเศร้า : Sertraline, Fluoxetine

ยาในกลุ่ม C ใช้ได้ในระยะ 3 เดือนแรก:

- ยาแก้ปวดง่าย ๆ : Aspirin
- ยาแก้ปวดกลุ่ม Triptan : Sumatriptan, Zolmitriptan
- ยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีน : Codeine
- ยาแก้ปวดกลุ่มอื่น : Orphenadrine
- ยากันชัก : Carbamazepine, Gabapentin, Lamotrigine, Topiramate
- ยาลดความดันโลหิต : Propranolol, Atenolol, Verapamil, Nifedipine

ยาแก้ปวดหัวที่แม่ใช้ได้ขณะให้นมแม่กับลูก

- ยาแก้ปวดง่าย ๆ : Acetaminophen, Caffeine
- ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs : Ibuprofen, Naproxen
- ยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีน : Codeine

ยาในกลุ่ม D :

- ยากันชัก : Phenobarbital, Phenytoin, Valproic acid,
- ยาระงับอาการซึมเศร้า : Amitriptyline, Nortriptyline

ยาในกลุ่ม X : ยาที่ห้ามใช้เด็ดขาดในคนตั้งครรภ์

- ยากกลุ่ม Ergots : Cafergot

ยาในกลุ่ม B ที่ห้ามใช้ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนคลอด:

- ยาแก้ปวดง่าย ๆ : Aspirin
- ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs : Ibuprofen, Naproxen